

VANNEAU HUPPÉ

Vanellus vanellus

Statut : C'est un nicheur sédentaire régulier, mais très localisé et en régression, dans l'extrême nord-ouest du pays (Merja Zerga et Merja Bargha), ainsi qu'un hivernant répandu sur les côtes atlantiques et méditerranéennes, au Sud jusqu'à Massa au moins, parfois jusqu'à Laâyoune, et pouvant même atteindre exceptionnellement le nord de la Mauritanie. Il hiverne aussi régulièrement dans l'intérieur du pays, surtout dans le nord et dans le centre. L'hivernage est plus important lors des hivers rigoureux. **Habitat :** Vasières, étangs et lacs avec végétation palustre ou eaux peu profondes. Bien que cette espèce visite volontiers l'intérieur des terres, on la rencontre essentiellement au Maroc dans des sites côtiers. **Description :** Assez grand Limicole (28-31 cm/envergure 67-76 cm), vert foncé sur le dos et les couvertures alaires. La calotte, agrémentée d'une longue huppe, les rémiges, le bout de la queue et une bande sur la poitrine, sont noirs. Les sous-caudales sont rousses et le reste des parties inférieures est blanc. La nuque est gris beigeâtre et la face est noire (mâle nuptial) ou bariolée de noir et blanc sale (mâle internuptial, femelle et jeunes oiseaux). Les pattes sont rosées (jeunes) à rouges (adultes nuptiaux). Une petite tache blanche est présente au bout de l'aile. **Confusions :** Ne ressemble à aucun autre oiseau. **Voix :** Cri habituel dissyllabique : « ki-vit » ou « pîe-vouît » perçant et aigu. Chant du mâle, émis en vol nuptial acrobatique, en émettant des « tchèè-rouît » incessants, les ailes produisant alors un son caractéristique.



Vanneau huppé (Gilles Willem)

PLUVIER ARGENTÉ

Pluvialis squatarola

Statut : Ce migrateur et hivernant très commun est observé presque toute l'année le long des côtes, avec un minimum en juillet ; très rare à l'intérieur des terres. **Habitat :** Plages et sites côtiers humides. **Description :** Ce grand pluvier (27-30 cm/envergure 71-83 cm) présente un plumage typique. L'adulte nuptial est noir de la face (à partir des yeux) jusque sur le ventre, les flancs et les axillaires (aisselles). Ce noir est intense chez le mâle et « sale » chez la femelle. Il est bordé d'une large bande blanche sur les sourcils, l'arrière de la joue et les côtés du cou. Sus-caudales et sous-caudales sont également blanches. Le reste des parties supérieures est gris argenté, moucheté de taches noires. Les pattes et le bec (assez court) sont gris foncé, presque noirâtres. Les oiseaux internuptiaux deviennent gris dessous, et perdent donc la grande zone noire, le seul « vestige » étant la tache noire aux axillaires, très caractéristique de l'oiseau (visible en vol seulement). Le juvénile est légèrement rayé sur la poitrine, mais autrement rappelle l'adulte nuptial. **Confusions :** Le Pluvier doré est, comme son nom l'indique, plus doré en tout plumage. Le jeune Pluvier argenté est légèrement doré sur les couvertures



Pluvier argenté nuptial (Benoît Maire)



Pluvier argenté internuptial (Benoît Maire)

sus-alaires, mais reste plus « froid » que le Pluvier doré, qui est également brun-jaunâtre sur les autres parties de son corps et de ses ailes. De plus, la calotte du Pluvier argenté est de la même intensité que le dos (plus foncé chez le Pluvier doré), et une zone sombre est nettement visible chez le juvénile (la face du Pluvier doré paraît nettement plus « dégagée »). **Voix :** Cri de contact sifflé généralement trisyllabique, typique : « tli-eu-î », accentué sur la seconde syllabe, qui est la plus basse.

PLUVIER DORÉ

Pluvialis apricaria

Statut : Hivernant localement fréquent, généralement d'octobre à mai, surtout observé dans les sites humides à proximité relative de la côte (souvent plusieurs dizaines de kilomètres), de la Méditerranée au Nord jusqu'à la lagune de Khnifiss, rarement plus au Sud. **Habitat :** Prairies humides ou non, cultures, marais salants et vasières. **Description :** L'adulte nuptial de ce pluvier de taille moyenne (26-29 cm/envergure 67-76 cm) est noir de la face (à partir des yeux) jusque sur le ventre, cette zone noire étant bordée de blanc sur les sourcils, le cou, les flancs et les sous-caudales. Notons que certains individus ont la poitrine blanchâtre grossièrement marquée de noir, au lieu de noir plein. Les parties supérieures sont entièrement gris foncé, fortement et régulièrement marquées de taches jaunes dorées, sauf les rémiges noires marquées quant à elles d'un liseré blanchâtre (barre alaire). Les pattes et le bec (assez court) sont gris foncé, presque noirs. Les oiseaux internuptiaux et les juvéniles sont blanchâtres sur le ventre, et brun doré sur la poitrine, la gorge et la face. Un sourcil clair reste visible, surtout chez l'adulte internuptial. **Confusions :** Voir Pluvier argenté. **Voix :** Cri de contact sifflé mélancolique, généralement monosyllabique, typique : « tuu » ou « puh ». Cri d'alarme plaintif : « tlu-i ».



Pluvier doré (Benoît Maire)



Pluvier doré (Christian Pouteau)

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU

Charadrius alexandrinus alexandrinus

Statut : Nicheur commun dans les zones favorables peu dérangées le long de toutes les côtes du pays, mais aussi sur certains points d'eau salés de l'intérieur. La majorité des individus marocains restent probablement toute l'année au Maroc, alors que des oiseaux européens augmentent les populations locales lors du passage et de l'hivernage. **Habitat :** Côtes sableuses, merjas salées temporaires ou permanentes. **Description :** Très petit Limicole (15-17 cm/envergure 42-45 cm), à la silhouette typique de *Charadriidae*. Il est brun sable sur le dos et



Gravelot à collier interrompu (Gilles Willem)